

Schellekens vogels

[Terug](#) [Putter](#) [Vink](#) [Zianette-S](#) [Quinette](#)

De Thekla-leeuwerik (*Galerida theklae*)

Het geslacht *Galerida* kent zes soorten:

1. Kuifleeuwerik (*Galerida cristata*) West Europa
2. Thekla-leeuwerik (*Galerida thekla*) Zuid Europa / Afrika
3. Zonneleeuwerik (*Galerida modesta*) Afrika
4. Malabar-kuifleeuwerik (*Galerida malabarica*) West India
5. Sykes kuifleeuwerik (*Galerida deva*) India
6. Grootsnavel leeuwerik (*Galerida magnirostris*) Zuid Afrika

De kweek van de Thekla leeuwerik Door L.J. Schellekens

Huisvesting:

De thekla leeuweriken zijn gehuisvest in een volière van ± 60 m². De volière is ruim beplant met hoofdzakelijk conifeer, taxus en buxus. Naast de thekla leeuweriken zitten er ook vinken, putters, sijzen, goudvinken, kneu, appelvinken en veldleeuweriken in. Deze soorten verdragen elkaar goed bij mij in de volière. Het is wel zo dat de thekla en de veldleeuweriken ieder een deel van de volière als territorium hebben. Zolang de broedtijd nog niet begint, zit alles mooi bij elkaar maar begin april worden de mannen wat agressiever en verhuist ieder naar zijn eigen deel. Komen ze te dicht bij elkaar dan wordt er wat bedreigd maar meestal blijft het daarbij.

Man / pop:

Bij mij in de volière zijn man en pop duidelijk van elkaar te onderscheiden. De bestreping van de pop is zwartbruin. Het tussenliggende bruin is donkerbruin. Bij de man is de bestreping en het tussenliggende bruin veel lichter van kleur, het is een beetje pastelachtig.

Kweek:

Begin april begint de man met zingen, eerst nog voorzichtig maar na een week voluit. De zang is erg melodieus. Ik vind de zang van de theklaleeuwerik veel mooier en gevarieerder dan van de veldleeuwerik.

Eind april heb ik voor het eerst baltsgedrag waargenomen.

De man danst voor, langs en om de pop heen, soms met opgeheven lichaam en kop dan weer met diepe buigingen. De kuif staat dan recht overeind. Het baltsen gaat de hele dag door. In deze periode duldt de man de veldleeuweriken niet in de buurt en ze worden dan ook stevast naar de andere kant van de volière verdreven.

Ik was benieuwd wanneer de nestbouw zou beginnen. Mijn ervaring met de veldleeuwerik was dat je het nest soms pas vond als de jongen al uit waren. In dit geval was het anders. In de eerste week van mei zag ik onder aan de stam van een conifeer dat er een holte was gemaakt en al enigszins bekleed met kokosvezel. Het nest lag eigenlijk maar een meter van het gaas af dus kon ik de zaak van buitenaf redelijk volgen. Een nadeel was dat het ook dicht bij het pad naar de deur van de volière lag, dus de kans op verstoren was duidelijk aanwezig.

Maar op 10-5-2008 lagen er twee eieren in het nest, meer zijn er ook niet gelegd. De eieren verschillen in grote en kleur niet van de veldleeuwerik. Voor de kleur en tekening zie foto.

De man was steeds in de buurt van het nest te vinden. De pop heb ik maar één keer op het nest aangetroffen en dat was, naar wat later blijkt, vlak voor het uitkomen van de eieren. Telkens als ik over het pad kwam aanlopen zag ik de pop gedoken het nest verlaten.



Na twaalf dagen lagen er twee jongen in het nest. Zoals je op de foto kunt zien, lijken ze meer op pluizenbollen dan op jonge vogels.

De voeding is een eigengemaakt eivoer, aangevuld met kiemzaad, diepvries pinky's, diepvries buffalo's en levende meelwormen. Voor de vinken kweek ik in de volière maden en ook daar wordt gretig van gegeten. De maden kweek ik door een verse kipfilet in een overdekte schaal in de volière te leggen zodat de vliegen er wel bij kunnen en de vogels niet. Als de eerste maden zich laten zien, doe ik ze in een bak waar wat zemelen inzit.

De vogels hebben direct in de gaten dat er tussen de zemelen wat beweegt en pikken de maden eruit. Het voordeel hiervan is dat je hele kleine maden hebt en dat ze vers zijn. De zemelen zorgen ervoor dat de huid van de maden niet meer plakt. Ook strooi ik losse zaden op de bodem van de volière. De bodem van de volière bestaat uit zwart zand en is altijd vochtig en dit zorgt er weer voor dat de zaden zacht worden en beginnen te kiemen. Ook gooi ik dagelijks een hand meelwormen over de bodem. Je ziet toch dat de vogels het liever vanaf de grond opnemen in plaats van uit een bakje. Na een paar dagen was er een jong verdwenen. Waar het is gebleven weet ik niet. Het andere jong groeide voorspoedig op. Ook toen er jongen waren, heb ik de pop nooit op het nest zien zitten. Toen het ene jong zeven dagen oud was, heb ik het geringd met 3,3 mm. Ik was er net op tijd mee, de dag erna was het nest leeg.

Na twee dagen zag ik het jong eigenlijk per toeval onder aan de voet van de taxus struik zitten. Ik heb het jong opgepakt en in een voerschaal gezet en zo een foto gemaakt. Het jong links op de foto is op dat moment negen dagen oud.



De jonge thekla leeuwerik op de foto hierboven is nu geheel zelfstandig. De foto is genomen 14-7-2008. Zoals je kunt zien, is de staart nu helemaal uitgegroeid. De stippen op het rugdek zijn er nog wel. Ook de kuif is inmiddels wat groter en de algehele kleur is wat lichter geworden. Bij leven en welzijn is de thekla leeuwerik op de komende BEC-show te zien.